

Copyright CSCF, 04.01.2010  
Base cartographique: OFS, OFT

### Répartition dans le monde

Le blageon vit en Europe centrale et du Sud, dans les bassins versants du Rhin, du Rhône, du Danube et du Pô; au nord jusqu'au Main et au sud jusqu'à l'Italie centrale. Des espèces similaires, proches parentes, vivent dans les Balkans. Au nord des Alpes, on trouve le blageon (*L.s. agassii*) et au sud le strigione (*L.s. muticellus*).

### Répartition en Suisse

En Suisse, le blageon était plus ou moins répandu au nord des Alpes dans la plupart des grands cours d'eau du Plateau suisse et était parfois également présent dans les lacs. De grands cheptels ont été mentionnés dans le Doubs, la Birse, la Thur et la Murg. Il semble avoir été rare à de nombreux endroits à moins qu'il ait simplement été jugé indigne d'être mentionné. On ignore si sa présence dans le Rhône près de Genève est naturelle ou si elle est due à des animaux introduits. Au sud des Alpes, le strigione était commun dans la plupart des cours d'eau jusqu'à une altitude de 300 à 400 mètres.

### Habitat

Le blageon préfère les eaux vives fraîches mais pas trop froides, au débit rapide, jusqu'à 700 mètres d'altitude (donc la partie inférieure des régions à truites, ombres et barbeaux). On ne le trouve dans les lacs qu'en dehors de la période de frai et à proximité des affluents. Un bon apport en oxygène et une structure du cours d'eau proche de la nature avec une variabilité importante de la largeur et de la profondeur sont décisifs. Il se tient de préférence dans les sections plus calmes; en hiver essentiellement dans les marmites de géant, en été dans les cours de grande profondeur. Seuls les jeunes privilégient les zones plates, à l'abri du courant. Les blageons aiment les cachettes et ont besoin d'abris constitués de plantes, de bois, etc. Ils vivent généralement en société avec six à dix autres espèces, notamment la truite de rivière, le chevaîne, le vairon et la loche. Leur comportement migratoire est peu connu, jusqu'ici seules des migrations sur de courtes distances ont été décrites.

### Sur la liste rouge!

Au nord des Alpes, le blageon ne se rencontre plus qu'isolé et en petits ou très petits cheptels résiduels. En raison du fort déclin de sa population et de sa répartition lacunaire, il figure sur la liste rouge en tant qu'espèce vulnérable (3). Au sud des Alpes, le strigione semble rester en partie répandu et vivre en populations groupées dans son aire de répartition initiale. Toutefois, même cette sous-espèce est classée vulnérable (3) en raison de sa répartition géographique limitée.

### Causes de la menace

Le blageon, en tant que poisson aimant le courant et frayant dans les gravières, fait partie du groupe comptant le plus d'espèces menacées. La principale menace est la destruction de son habitat (aménagement des cours d'eau, retenues, canalisations). Mais la pollution des eaux et la prise en compte tardive de l'espèce dans la gestion halieutique ont également laissé des traces.

### Exploitation halieutique

Le blageon a, par le passé, été très peu exploité pour la pêche, si l'on excepte sa rare utilisation comme appât. Il n'y a qu'au Tessin qu'on trouve des rapports d'utilisation en tant que nourriture en assez grand nombre. L'importance du blageon tient surtout à sa contribution à la biodiversité et à son rôle dans la chaîne alimentaire comme nourriture pour les truites et d'autres poissons carnassiers. Dans les zones où il reste répandu, le blageon est parfois pêché avec la canne au flotteur ou à mouche, un petit hameçon et une ligne fine. Afin de protéger l'espèce, il faut toutefois renoncer au prélèvement ou à l'utilisation comme appât.

### Références

Schwarz M 1998: Biologie, menaces et protection du blageon (*Leuciscus souffia*) en Suisse. OFEV, Informations concernant la pêche n° 59; Kirchhofer A., Breitenstein M., Zaugg B. 2007: Liste rouge des poissons et cyclostomes de Suisse, OFEV, Berne. L'environnement pratique n° 0734. 64 S; Gerstmeier R., Roming T. 2003: Die Süßwasserfische Europas (Kosmos Naturführer) Hartmann U. 2003: Süßwasserfische (Steinbachs Naturführer)





Fédération Suisse de Pêche FSP



# Diversité en milieu aquatique Le blageon

Poisson de l'année 2010



## Poisson de l'année 2010

**Le blageon est le poisson de l'année 2010! La Fédération Suisse de Pêche FSP braque ainsi les projecteurs sur un poisson fortement menacé et méconnu. Le blageon figure sur la liste rouge des poissons menacés. Il est donc grand temps de communiquer sur son importance biologique, sa performance écologique et la menace actuelle.**

### Ecologiquement précieux

Le blageon joue un rôle important dans la diversité écologique et dans la chaîne alimentaire. C'est pourquoi il a été, de manière réfléchie, élu poisson de l'année 2010, année internationale de la biodiversité. Cette espèce permet, malheureusement, de mettre parfaitement en évidence les menaces qui pèsent sur les poissons et les cours d'eau.

### Méconnu, mésestimé, menacé!

Oui, le blageon mérite davantage d'attention! A l'origine, il était largement répandu. Aujourd'hui, même les pêcheurs sont nombreux à ne pas le connaître. Du fait de sa taille plutôt modeste et de sa chair riche en arêtes, il n'a jamais joué un rôle comme poisson comestible. Mais il y a bien plus dramatique que le fait qu'il ne soit reconnu ni des pêcheurs, ni des gastronomes: le déclin drastique de sa population. Il a entre-temps complètement disparu de nombreux cours d'eau.

### Nom

Le blageon (*Leuciscus souffia*) est présent à la fois sur les versants nord et sud des Alpes. Les deux sous-espèces (*Leuciscus souffia agassii* et *Leuciscus souffia muticellus*) se distinguent légèrement au niveau de quelques caractéristiques. Comme la plupart des autres espèces de poissons, le blageon possède également une variété de noms locaux différents. Ceux-ci étant souvent source de confusion, ils devraient être employés avec circonspection:

- f.: Blageon, Blanc, Souffie, Zizer
- it.: Vairone, Strigione, Mozetta
- d.: Aartzele, Ischer, Riemling, Risling, Strömlig, Schwal, Ziger u.v.a.

### Caractéristiques

Le blageon est petit et fuselé. Il ne mesure que 12 à 18 centimètres (25 cm maximum), il appartient à la même famille que les carpes et présente de très grosses écailles. Son corps est allongé et peu aplati sur les côtés, il possède une bouche infère. Ses aspects marquants sont la ligne latérale bordée de jaune et la base des nageoires jaune orangé, ainsi qu'une bande longitudinale sombre plus ou moins marquée. Le blageon peut être confondu avec la vandoise, le spirilin ou le toxostome.

- La vandoise (*Leuciscus*) se distingue par sa tête plus courte et sa teinte plus pâle.
- Le spirilin (*Alburnoides bipunctatus*) a un dos plus haut et est plus aplati sur les côtés. Sa nageoire anale est nettement plus longue.
- En Suisse, le toxostome (*Chondrostoma toxostoma*) n'est présent que dans le Doubs. Vue d'en dessous, sa bouche est arquée, avec une lèvre inférieure aux arêtes vives. Il lui manque la pigmentation caractéristique jaune orangé.

### Alimentation

Le blageon se nourrit essentiellement de microfaune, notamment d'insectes, parfois aussi de plantes (diatomées et algues vertes). La nourriture est consommée à tous les niveaux, aliments dérivant, planctons, mais aussi microfaune vivant au fond et aliments apportés par le vent. Les insectes sont gobés à la surface et attrapés en sautant.

### Reproduction

La période de frai a lieu de mars à mai (rarement jusqu'au début juin) à env. 12° C; environ un mois plus tard sur le versant sud des Alpes. Le blageon fraye dans les gravières et préfère un substrat peu compact, propre, d'un diamètre de deux à trois centimètres. Les 1 000 à 6 000 œufs de 2 millimètres de diamètre et les larves se développent dans les interstices du gravier. Bien qu'ils atteignent leur maturité sexuelle vers 2-3 ans (>11 cm), les blageons peuvent vivre jusqu'à 13 ans.



**Schweizerischer Fischerei-Verband SFV**  
**Fédération Suisse de Pêche FSP**  
**Federaziun Svizra da Pestga**  
**Federazione Svizzera di Pesca**

[www.sfv-fsp.ch](http://www.sfv-fsp.ch)

### Le blageon en bref

Longueur: 12-18 (25 cm)  
Poids: ~125 g  
Age: ~13 ans  
Nombre d'œufs: 1000-6000  
Période de frai: III - V(VII)



### Mentions légales

#### Editeur

© Fédération Suisse de Pêche FSP, Berne; [www.sfv-fsp.ch](http://www.sfv-fsp.ch)  
Textes: Martin Huber; photos: P. Jean. Richard; rédaction/production: Kurt Bischof

Avec le soutien de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et du 111er Club (association des sponsors de la FSP).

