



www.sfv-fsp.ch

Schweizerischer Fischerei-Verband SFV
Fédération Suisse de Pêche FSP
Federaziun Svizra da Pestga
Federazione Svizzera di Pesca

Notice d'information sur la plaie des cormorans

Les populations d'oiseaux piscivores – et notamment de cormorans – doivent être régulées de toute urgence !


La FSP lutte contre la plaie des oiseaux piscivores

La Fédération Suisse de Pêche FSP lutte depuis des années contre la plaie des oiseaux piscivores. La situation ayant pris une ampleur insupportable, une pétition a été lancée.

Oiseaux piscivores contre pêche à la ligne et protection des espèces

Dans les années 70, les pêcheurs à la ligne étaient les principaux utilisateurs des cours d'eau. Aujourd'hui, ce sont les oiseaux piscivores, d'où un danger croissant pour les espèces de poisson menacées (ex. les ombres).

1970 : pêcheurs 308 t 2004 : oiseaux 134 t



Les cormorans en tête

Dans les cours d'eau surveillés par la station ornithologique de Sempach, les trois principales espèces d'oiseaux piscivores ont mangé les quantités suivantes en 2004 :

1. **Cormoran : 900 000 poissons/ 65 t**
2. **Héron cendré : 800 000 poissons/ 48 t**
3. **Harle bièvre : 500 000 poissons/ 20 t**


Le cormoran, qui se nourrit de poissons d'une longueur pouvant atteindre 55 cm, mange environ 500 grammes de poisson par jour.

Les pêcheurs professionnels victimes des cormorans

Les cormorans s'attaquent de plus en plus souvent aux poissons pris dans les filets des pêcheurs professionnels, provoquant non seulement des pertes de recettes, mais aussi des dégâts massifs sur les filets.

Essor rapide des colonies nicheuses

Jusqu'en 2000, les cormorans ne nichaient pas en Suisse. La première colonie nicheuse est apparue en 2001 dans le Fanel. Selon les indications de la station ornithologique de Sempach, on comptait déjà six colonies pour un total de 547 couples nicheurs en 2009. Cette évolution doit être rapidement enrayerée, en huilant les œufs, par exemple.



La période de fermeture de la chasse doit être raccourcie

A la fin de l'hiver, les cormorans décident de rester en Suisse pour nicher ou de migrer vers le Nord. La période de fermeture de la chasse doit donc être ajustée dans les pays voisins.

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct
Suisse			Période de fermeture de la chasse							
Bavière										
Bade-Wurtemberg										