

Morphologie

Fehlender Lebensraum für Fische


Abfliessendes Regen- oder Quellwasser hat sich ursprünglich einen schlängelnden oder mäandrierenden Weg durch die Landschaft gegraben. Die ursprüngliche Flusslandschaft ist geprägt durch ein verzweigtes, dichtes Gewässernetz mit breiten Flussbetten und ausgedehnten Sumpfgebieten.



Morphologie

Manque d'espace vital pour les poissons

A l'origine, les eaux de pluie et de source s'écoulaient en décrivant des courbes et des méandres dans le paysage. L'espace fluvial naturel était marqué par un réseau de cours d'eau dense, très ramifié, avec des lits de fleuves larges et des zones marécageuses étendues.



Heute weisen von 65 000 km Fließgewässern rund 16 000 km eine ungenügende morphologische Qualität auf; sie sind stark verbaut oder eingedolt. Dies entspricht rund 25 Prozent aller Flüsse und Bäche. Im Mittelland sind über 40 Prozent der Gewässer betroffen.

Sur 65 000 km de cours d'eau, environ 16 000 présentent aujourd'hui une qualité morphologique insuffisante; ils sont fortement aménagés ou enterrés. Cela correspond à environ 25 % de tous les fleuves et rivières. Dans le Plateau suisse, plus de 40 % des cours d'eau sont concernés.

